

Parapic® Fiala a stilo/Spray/Roll-on

Biomed AG

Che cos'è Parapic e quando si usa?

Parapic è un liquido dalla rapida azione analgesica e antipruriginosa, da applicare direttamente sulla pelle, sul punto coinvolto, dopo una puntura d'insetti. Parapic esplica un'azione leggermente disinfettante, antiflogistica, decongestionante e rinfrescante.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Le persone che presentano reazioni allergiche alle punture di determinati insetti (api, vespe, ecc.), devono assolutamente attenersi anche alle misure terapeutiche prescritte dal medico.

Quando non si può usare Parapic?

Non utilizzare Parapic in caso di ipersensibilità nota nei confronti di uno degli elementi secondo la composizione (cfr. «Cosa contiene Parapic?»).

Il preparato non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore a 2 anni e mezzo, poiché i componenti levomentolo e cineolo possono causare laringospasmi o arresto respiratorio in caso di inalazione accidentale.

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Parapic?

Informi il suo medico o il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa) o li applica esternamente.

Si può usare Parapic durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico o farmacista o droghiere.

In particolare, durante l'allattamento, va evitata l'applicazione nella zona del seno e su superfici estese.

Come usare Parapic?

Tamponare leggermente, rispettivamente nebulizzare con Parapic la zona punta, all'occorrenza più volte al giorno. Il preparato non deve essere utilizzato nei bambini di età inferiore a 2 anni e mezzo (cfr. «Quando non si può usare Parapic?»).

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Parapic?

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

Irritazioni cutanee o reazioni allergiche.

Frequenza: non nota

Nei bambini di età inferiore a 2 anni e mezzo possono verificarsi laringospasmi o arresto respiratorio in caso di inalazione accidentale.

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, farmacista o droghiere, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C).

Ulteriori indicazioni

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Il medico o il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Parapic?

Principi attivi

1g di soluzione contiene: 20 mg di levomentolo, 10 mg di mepiramina maleato, 12.5 mg di cineolo, 20 mg di macrogol lauril etero

Sostanze ausiliarie

Alcool isopropilico

Numero dell'omologazione

42778 (Swissmedic)

Dove è ottenibile Parapic? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Fiala a stilo Parapic, confezione da 3 ml

Spray Parapic, confezione da 15 g

Roll-on Parapic, confezione da 7.5 ml

Titolare dell'omologazione

Biomed AG, CH-8600 Dübendorf

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel gennaio 2020 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

17793 / 31.03.2021