

Parapic®; Fiala a stilo/Spray/Roll-on

Biomed AG

OOMed

Che cos'è Parapic e quando si usa?

Parapic è un liquido dalla rapida azione analgesica e antipruriginosa, da applicare direttamente sulla pelle, sul punto coinvolto, dopo una puntura d'insetti. Parapic esplica un'azione leggermente disinfettante, antinfiammatoria, decongestionante e rinfrescante.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Le persone che presentano reazioni allergiche alle punture di determinati insetti (api, vespe, ecc.), devono assolutamente attenersi anche alle misure terapeutiche prescritte dal medico.

Quando non si può usare Parapic?

Parapic non deve essere usato in caso di ipersensibilità accertata nei confronti di una o più delle componenti (p.e. mepiramina maleato).

Quando è richiesta prudenza nell'uso di Parapic?

Per i bambini di età inferiore ai 2 anni, il preparato può essere usato solo dietro prescrizione medica. Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere nel caso in cui:

- soffre di altre malattie
- soffre di allergie o
- assume o applica esternamente altri medicinali (anche se acquistati di sua iniziativa).

Si può usare Parapic durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicinali durante la gravidanza e il periodo d'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare Parapic?

Tamponare leggermente, rispettivamente nebulizzare con Parapic la zona punta, all'occorrenza più volte al giorno. Uso per i bambini d'età inferiore ai 2 anni solo dietro prescrizione medica. Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali può avere Parapic?

Con l'applicazione di Parapic possono manifestarsi i seguenti effetti collaterali:

Le componenti del preparato (p.e. mepiramina maleato) possono provocare occasionalmente irritazioni cutanee o reazioni allergiche. Se osserva effetti collaterali qui non descritti dovrebbe informare il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Conservare Parapic a temperatura ambiente (15-25 °C) e fuori dalla portata dei bambini. Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore. Il medico, il farmacista o il droghiere possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contiene Parapic?

1 g di liquido contiene: 20 mg di levomentolo, 10 mg di mepiramina maleato, 12.5 mg di cineolo, 20 mg di polidocanolo 600, alcol isopropilico.

Numero dell'omologazione

42778 (Swissmedic).

Dov'è ottenibile Parapic? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica. Fiala a stilo Parapic, confezione da 3 ml

Spray Parapic, confezione da 15 g Roll-on Parapic, confezione da 7.5 ml

Titolare dell'omologazione

Biomed AG, 8600 Dübendorf.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel febbraio 2006 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

17793 / 26.04.2014